

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Embrapa Clima Temperado**  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
BR 392 - km 78 - Fone (53) 3275-8100  
CEP 96010-971 - Cx. Postal 403 - Pelotas, RS  
[www.embrapa.br/clima-temperado](http://www.embrapa.br/clima-temperado)  
[www.embrapa.br/fale-conosco](http://www.embrapa.br/fale-conosco)

**Embrapa Produtos e Mercado  
Escritório de Campinas – SP**  
Email: [spm.ecpq@embrapa.br](mailto:spm.ecpq@embrapa.br)  
Telefone: (19) 3749-8888 - Fax: (19) 3749-8890  
End. Escritório: Av. Dr. André Tosello, 209  
Cidade Universitária - Caixa Postal 6062  
CEP 13083-970 - Campinas/SP

**Escritório de Canoinhas – SC**  
Email: [spm.ecan@embrapa.br](mailto:spm.ecan@embrapa.br)  
Telefone: (47) 3624-0127 - Fax: (47) 3624-2077  
End. Escritório: Rod. BR 280, km 231, nº 1151  
Bairro Industrial II - Caixa Postal 317  
CEP 89.460-000 - Canoinhas/SC

Embrapa Clima Temperado - Outubro de 2016 - Tiragem: 300 exemplares



MINISTÉRIO DA  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO**



# CULTIVAR DE PESSEGUEIRO BRS CITRINO

Cultivar de maturação precoce,  
para a indústria conserveira





## PLANTA

A planta é de vigor e porte médios, e os ramos de frutificação têm boa densidade de gemas.



## FLORAÇÃO

A plena floração ocorre em geral no terceiro decêndio de julho (em alguns anos esporádicos pode ocorrer na segunda semana).



## MATURAÇÃO

A maturação dos frutos inicia, geralmente, na primeira semana de novembro, sendo cerca de duas semanas antes da maturação da cultivar Sensação. É, em grande parte, coincidente com a maturação dos frutos da cultivar Bonão.

Foto: Paulo Lanzetta



## FRUTA

Os frutos de '**BRS Citrino**' são de forma redonda a redonda-cônica, geralmente sem ápice proeminente. O tamanho tem variado ao longo dos anos entre 5,4 cm e 7,4 cm, dependendo do manejo e das condições climáticas do ano. A película é amarela, com cor de cobertura vermelha sólida, estendendo-se por 30% da área e, não raro, cobrindo até 60-70%. O sabor é doce-ácido, predominando a acidez.

## ADAPTAÇÃO

É uma cultivar de baixa necessidade em frio hibernal (acúmulo de horas inferior a 200 horas abaixo de 7,2°C). Não deve ser plantada em locais onde é comum a ocorrência de geadas.



## DISPONIBILIDADE

Mudas desta nova cultivar poderão ser obtidas junto aos viveiristas licenciados pela Embrapa. Para conhecê-los, consulte o site: <https://www.embrapa.br/produtos-e-mercado/pessegue>

